

Jularo

ABG		Standort	BL	Jahr	abs. Ertrag	Sortenmittel	Bedeckungsgrad	Pflanzenlänge	Lager	Feuchtkleber	Rohprotein TM	Sedimentationswert	Backvolumen	Fallzahl	Braunrost	DTR	Blattseptoria	Mehltau	TKM	hl-Gewicht			
Nr.	Bez.	Ort			dt/ha	dt/ha	%	cm	Note 1-9	%	%	Eh.	ml	s	Note 1-9	Note 1-9	Note 1-9	Note 1-9	g	kg			
3	Lehmige Standorte West	ALS	HE	2009	49,4	52,7				23,5	10,8	40,0		247									
				2010	56,6	57,5							12,2		137								
				2011	75,0	75,4							16,9	9,9	36,0		315						
6	Ackerbau gebiete Süd / Höhenlagen Süd-West	KI-D	BW	2008	46,4	44,6				26,0	11,8	43,0	649										
				2009	51,5	51,5						23,1	10,6	39,0	588								
		KI-C	BW	2010	46,6	45,0	76 (25.05 .)	112			24,3	12,0	50,0		217						49,0	77,0	
				2011	36,0	32,8		85	1,0	20,3	9,2	39,0		356			3,0						
		HH	BW	2010	51,1	57,4																	
				2011	53,3	53,0		109	1,0							7,0							
		HÜ	BW	2010	49,9	43,8																	
				2011	50,4	55,0														6,0			
		KAG	BW	2010	65,0	78,2																	
				2011	48,9	60,0		118	4,0								2,5	1,0	2,5				
WEI	RP	2009	24,6	25,2		91	1,0	23,0	10,5	42,0			381	2,0		2,0	1,0	53,3					
		2010	/	/		116	1,0	23,3	11,4	44,0			317	2,3		3,0	1,0	51,4					
		2011	45,3	53,9		103		14,2	10,1	40,0			256	1,0		1,0		51,8					
WAH	RP	2010	62,8	76,1		124		28,0	12,4	58,0			362	2,3		2,8	1,0	48,8	78,5				
		2011	42,4	46,0		99	1,0	21,2	11,1	39,0			317	4,7		5,0	1,8	54,2	76,6				