

Laurin

| ABG | | Standort | BL | Jahr | abs. Ertrag | Sortenmittel | Bedeckungsgrad | Pflanzenlänge | Lager | Feuchtkleber | Rohprotein TM | Sedimentationswert | Backvolumen | Fallzahl | Braunrost | Blattseptoria | TKM | hl-Gewicht | |
|-----|--|----------|----|------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------|--------------|---------------|--------------------|-------------|----------|-----------|---------------|------|------------|--|
| Nr. | Bez. | Ort | | | dt/ha | dt/ha | % | cm | Note 1-9 | % | % | Eh. | ml | s | Note 1-9 | Note 1-9 | g | kg | |
| 3 | Lehmige Standorte West | ALS | HE | 2008 | 63,9 | 65,7 | | | | | | 35,0 | | 364 | | | | | |
| | | | | 2009 | 46,5 | 52,7 | | | 23,1 | 10,3 | 37,0 | | 369 | | | | | | |
| | | | | 2010 | 56,8 | 57,5 | | | | | 11,3 | | | | 178 | | | | |
| 6 | Ackerbau gebiete Süd / Höhenlagen Süd-West | KI-D | BW | 2007 | 22,0 | 22,7 | | | | 22,6 | 10,0 | 43,0 | 575 | | | | | | |
| | | | | 2008 | 45,1 | 44,6 | | | 27,0 | 11,6 | 52,0 | 676 | | | | | | | |
| | | | | 2009 | 49,7 | 51,5 | | | 24,8 | 10,7 | 47,0 | 621 | | | | | | | |
| | | KI-C | BW | 2010 | 44,9 | 45,0 | 75 (25.05 .) | 101 | | 22,2 | 11,1 | 48,0 | | 217 | | 3,0 | 37,0 | 79,0 | |
| | | | | 2011 | 34,2 | 32,8 | | | 1,0 | 21,1 | 10,5 | 48,0 | | 344 | | 3,0 | | | |
| | | HH | BW | 2011 | 54,8 | 53,0 | | 99 | 2,0 | | | | | | | 5,8 | | | |