

Amilo

ABG		Standort	Jahr	abs. Ertrag	Sortenmittel	Pflanzenlänge	Lager	Rohprotein TM	Fallzahl	Braunrost	Mehltau	TKM	hl-Gewicht	Verkleisterungs maximum	Verkleisterungs temp	Rhynchosporium		
Nr.	Bez.	Ort		dt/ha	dt/ha	cm	Note 1-9	%	s	Note 1-9	Note 1-9	g	kg	AE	°C	Note 1-9		
3	Lehmige Standorte West	ALS	2007	46,9	43,7				272									
			2009	62,8	71,9			9,9	280									
			2011	68,8	77,0			9,1	227									
4	Lößstandorte Mittel-Ostdeutschland	MW (RO;BBG;MSÖ)	2008	58,2	62,5													
			2009	73,2	78,7	161	2,6	11,4	335	3,0	2,0	35,9	76,6 (RO;BBG)					
			2010	57,9	68,5	161	2,3	10,0	259	2,3	2,5	36,4	72,9					
			2011	40,3	51,8													
6	Ackerbaugebiete Süd / Höhenlagen Südwest	MW (KI-D;HH)	2008	52,7	49,3	142	1,5		346 (KI-D)					1910 (KI-D)				
			2009	44,6	47,0	129 (KI-O)						38,6 (KI-O)	77,6 (KI-O)					
			2010	44,3	48,9					391 (HH)					1180 (HH)	76,5 (HH)		
			2011	51,6	49,7	135 (KI-C;HH;KAG)	2,1			4,9 (HH;KAG)								
			Roggenversuch K.J.Müller 2008															
		Dottenfelder Hof	2008	54,8	55,6	175	6,0		340	6,0		26,0					2,0	
		Höllwangen	2008	29,1	37,4	155	5,0		322			33,0					1,3	